

Hepatitis A bifásica en niños

En este suplemento de la Revista Gastrohnut, Barragán DF et al., reportan nueve casos de niños que presentaron hepatitis A bifásica.

La hepatitis A es una enfermedad de amplia distribución mundial y endémica en los países en desarrollo. En áreas de alta endemicidad como en los países en vía de desarrollo en donde el mayor número de infectados son niños, el virus se propaga rápidamente. Colombia es un país de alta e intermedia endemicidad para el VHA. Estudios seroepidemiológicos realizados en Bogotá, Colombia, demuestran una mayor proporción de susceptibles en estratos socioeconómicos altos y medios. La viremia ocurre durante la fase prodrómica. Entre un 3 a 20% de los casos de infección por el VHA, presentan hepatitis recidivante o bifásica. No se conocen con precisión los fenómenos virológicos e inmunológicos subyacentes de la hepatitis A bifásica. Se han planteado dos hipótesis que

darían explicación a la fisiopatogenia de esta forma de comportamiento.

La lectura de estos casos junto con la revisión del tema de manera actualizada, apoyará a despejar preguntas acerca de la entidad.

Barragán DF, Velasco CA. Hepatitis A bifásica en niños colombianos: reporte de nueve casos y revisión de la literatura. Rev Gastrohnut 2010; 12 (2) (Supl. 1): S4-S7

CARLOS ALBERTO VELASCO BENÍTEZ

Editor

Director del Grupo de Investigación en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica GASTROHNUP. Universidad del Valle

Profesor Titular. Universidad del Valle

Cali, Agosto 15 de 2010